

まぶたの重さを改善して、
★ 明るい視界をサポートします

アップニークミニ[®] 点眼液のご案内

自由診療（健康保険適用外）

アップニークミニ点眼液は、成人の眼瞼下垂によるまぶたの重さや見えづらさを改善するお薬です。当院では、医師の診察のもと、適応を判断したうえで処方しています。



まぶたの重さを改善してはっきりとした視界を！



費用について



初診料
(診察料)

2,200円(税込)



再診料
(2回目以降)

1,100円(税込)



アップニークミニ
1箱(30本・30日分)

5,500円(税込)

※上記は自費診療の料金です。
※他の医療機関での受診や処方との重複はできません。

！ 大切なお知らせ

他科の受診や眼科の他の疾患の
定期受診と同日には、
処方できません。

必ず当院での診察・処方となりますので、
あらかじめご了承ください。



治療の流れ

1 診察

まぶたの状態や
症状について医師が診察します。



2 点眼開始

1日1回、点眼して
いただきます。



3 定期受診

効果や安全性を確認するため、
定期的に受診していただきます。



4 効果の確認

まぶたの引き上がりや
見え方の変化を一緒に確認します。



アップニークミニについて



- 有効成分 オキシメタゾリン塩酸塩 (0.1%)
- 剤形 1回使い切りの点眼容器 (0.3mL)
- 包装 30本入り (1箱)
- 製造販売元 参天製薬株式会社

1日1回の点眼で
約15分後から
効果が出現します。



効果について

- ✓ 1日1回の点眼で、約15分後から効果が出現します。
- ✓ 効果は通常、翌日には消失するため、継続して点眼することが必要です。
- ✓ 継続することで、まぶたの引き上げ効果が期待できます。

！ ご理解いただきたいこと

- 1 この薬は、まぶたの重さを改善するためのもので、まぶたのたるみを完全に治すものではありません。
- 2 まれに、目のかゆみ、充血、まぶたの痛み、霧視、羞明などの副作用があらわれることがあります。
- 3 使用前にコンタクトレンズは外してください。
- 4 他の点眼薬と併用する場合は、医師・薬剤師にご相談ください。
- 5 定期的な受診を継続してください。
- 6 医師の指示に従って正しく使用してください。



使用上の注意

- ✓ 開封後は、なるべく早めに使用してください。
- ✓ 1本で1回使い切りです。
- ✓ 点眼後は、しばらく目を閉じてください。
- ✓ コンタクトレンズは外してから使用してください。
- ✓ 目に異常を感じた場合は、すぐに医師にご相談ください。



牛久愛和総合病院 眼科

☎ 029-873-3111 (代表)

お問い合わせ時間 8:30~16:00(平日)

治療は事前予約が必要です。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

